

Entomología Agrícola

PLAGAS 1

(Cereales y algunas polífagas)

Juan Barriuso Vargas


VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

MOSQUITO DEL TRIGO

Ciclo biológico

HESSIAN



MOSQUITO DEL TRIGO



MOSQUITO DEL TRIGO



MEDIOS DE CONTROL DEL MOSQUITO DEL TRIGO **(Mayetiola destructor, M. mimeuri y M. avenae)**

BIOLÓGICOS

Respetar el ecosistema: Mantener la fauna auxiliar
Himenópteros Pteromálidos (*Meraporus graminicola*),
Eupélmidos y Torímidos

CULTURALES

Rotura del ciclo biológico: retrasar siembras
Retrasar labor de alzada. Labor profunda de arado.
Desterronado. Gramíneas espontáneas.
Sustituir trigo por avena.
Abonado racional (> ahijado)
M.G.V.: *Triticum* x *Aegilops*.

QUÍMICOS (caros y poco rentables)

Contra larvas de generación otoñal en parcelas para semilla

CHINCHES DEL TRIGO

Aelia rostrata



M. Javahery - Photographer

CHINCHES DEL TRIGO

Eurygaster austriacus



Wasps parasitizing Sunn Pest eggs

MEDIOS DE CONTROL DE LOS CHINCHES DEL TRIGO

(*Aelia rostrata*, *A. germari* y *Eurygaster austriacus*)

BIOLÓGICOS

Respetar el ecosistema: Depredadores naturales inespecíficos

Coleópteros e Himenópteros

Hongo: *Beauveria bassiana*

CULTURALES

Siembras: variedades tempranas, Cebada

Destruir refugios invernales

QUÍMICOS

Tratamientos aéreos de choque (líneas de semilla) por ingestión o contacto – U.B.V. (U.L.V.)

ZABRUS TENEBRIOIDES



ZABRUS TENEBRIOIDES



ZABRUS TENEBRIOIDES



MEDIOS DE CONTROL DEL ZABRO O ZABRUS (*Zabrus tenebrioides*)

BIOLÓGICOS

Respetar la fauna auxiliar: Depredadores naturales

Díptero taquínido: (*Viviana cinerea*)

CULTURALES

Siembras tardías

Rotación de cultivos

Incrementar la semilla del 20-30%

Destruir refugios estivales: arar rastros

QUÍMICOS (en entredicho)

- Insecticidas de suelo: Clorpirifos ...

Cnephasia



Cnephasia



Cnephasia pasiuana



Cnephasia



MEDIOS DE CONTROL DEL GUSANO DE LA ESPIGA (NEFASIA)

**(Cnephasia pasiuana sin. C. puminaca, C. pascuana, C.
obsoletana)**

BIOLÓGICOS

Depredadores naturales

Himenópteros Ichneumonídeos, Braconídeos y Trichogrammátidos

CULTURALES

Siembras tardías (cereal de primavera)

Rotación de cvs. (sin cereal)



QUÍMICOS

Tratamientos con carbamatos, organofosforados y piretroides

Márgenes de la parcela + herbicida hormonal

Umbral económico de daños: 25-30 l/m² (3-4 l/espiga)

Dociostaurus maroccanus




Dociostaurus maroccanus

Michel Clémot - 1997



Dociostaurus maroccanus



CONTROL DE LA LANGOSTA COMÚN O MARROQUÍ (*Dociostaurus maroccanus*)

BIOLÓGICOS

Respetar la fauna auxiliar

- Aves
- Insectos depredadores (**Coleópteros**)
- Insectos parásitos (**Himenópteros** y **Dípteros**: *Glossina infuscata* - oófago)
- Hongos y bacterias

CULTURALES

Preventivos: vigilancia de focos

QUÍMICOS

Inhibidores de la síntesis de quitina

Tratamientos en fase "saltón"

Adultos a U.B.V.



Comprobar siempre el regreso a la fase solitaria

Oxithrea funesta



***Diabrotica virgifera*
*virgifera***



© Antonio López
alrfole.com

Oulema melanopus



Mythimna unipuncta



Mythimna unipuncta



Sesamia nonagrioides



Sesamia nonagrioides



Trichogramma evanescens



Beauveria bassiana

Ostrinia nubilalis



Ostrinia nubilalis

Ooplaca



MEDIOS DE CONTROL DE LOS TALADROS DEL MAÍZ (*Ostrinia nubilalis* (sin. *Pyrausta nubilalis*) y *Sesamia nonagrioides*)

BIOLÓGICOS

Himenópteros oófagos (*Trichogramma*)

Himenópteros y Dípteros parásitos (*Taquínidos*)

Bacillus thuringiensis

CULTURALES

Picado de los cañotes y labor profunda en abril u otoño. Quemado de rastrojo
¿?. Pastoreo

Elección de variedades

- transgénicas Bt.
- resistentes
- precoces

Época de siembra: tardía

QUÍMICOS

Insecticidas microgranulados (suelo)

Umbral: 8-10 ooplacas/100 pies (al 50% de panículas visibles)

CHILO DEL ARROZ

CHILO SUPPRESSALIS



CHILO DEL ARROZ

CHILO SUPPRESSALIS



CHILO SUPPRESSALIS

	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^a generació					A P	A P L C	L C					
2 ^a generació							A P L C	A P L C				
3 ^a generació								A P L C	A P L C			
	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS

A- Adults

L- Larves a l'arròs

C- crisàlides


P- Postes

LS- Larves al senill

MEDIOS DE CONTROL DE LA PUDENTA DEL ARROZ (*Eysarcoris inconspicuus*)



Eysarcoris inconspicuus




INSECTOS DEL SUELO

Agriotes lineatus



INSECTOS DEL SUELO

Agrotis ipsilon



INSECTOS DEL SUELO
Agrotis ipsilon



Agrotis ipsilon (Hufnagel)



INSECTOS DEL SUELO
Agrotis ipsilon



Control de INSECTOS DEL SUELO

(Agriotes spp., Agrotis spp., etc)

- **Drenaje de las parcelas**
- **Evitar alfalfas y cvs. forrajeros precedentes**
- **Labores de invierno y verano (profundas y superficiales)**
- **Químicos (difícil y cara)**
- **Feromona looplure (estirpes)**
- **Tratamientos de semillas**
- **Cvs. limpios, trampas cebos envenenados (salvado+ insecticida; triclorfon o el autorizado)**